



Uzimanje uzoraka za dijagnostiku urogenitalnih mikoplazmi

Endocervikalni i uretralni uzorci:

Koristiti samo Dacron ili sintetski bris, ili citološku četkicu za uzimanje uzoraka. Preporučamo originalni bris iz kompleta za testiranje kojeg možete dobiti u Mikrobiološkom laboratoriju zajedno s transportnim medijem.

Uzorak uzeti nakon što je ulaz ili okolina dobro očišćena prvim brisom.

Opaska: Mikoplazme snažno prijanjaju na mukozne stanice. Sluznicu treba dobro ostrugati za dobivanje bogatog uzorka.

Inokulirajte bris u transportni medij „T broth“ na način da ga dobro isperete u bujonu, ocijediti na stjenci bočice i bris bacite u infektivni otpad.

Bočicu treba dobro začepiti s pripadajućim čepom i gumicom da se izbjegne istjecanje uzorka.

Urin

Uzorak urina se može uzeti samo ako je od prethodnog mokrenja prošlo najmanje 2 sata.

Sakupiti prvi mlaz urina u sterilnu bočicu.

Ostali uzorci, npr., ejakulat ili manje tekuće uzorke sakupiti u sterilnu bočicu.

Opaska / skladištenje tijekom transporta:

Test kultivacije treba započeti što je prije moguće, inače može voditi lažnom rezultatu. Usprkos tome inokulirani transportni medij "T broth" može se čuvati 8 sati na sobnoj temperaturi (18 - 25°C) ili maksimalno 48 sati na 2 - 8°C. Zbog pouzdanosti nalaza molimo da se pridržavate roka dostave u Mikrobiološki laboratorij.

Na posudu s uzorkom obavezno naznačiti ime i prezime pacijenta, vrstu uzorka i datum sakupljanja (poželjna je naljepnica koja ne pokriva lot transportnog medija).